

注射須知

Juvéderm® 喬雅登® 是一種凝膠狀的注射型玻尿酸。玻尿酸是一種天然醣類聚合物，可以穩定肌膚結構，補水、保水，讓肌膚緊緻有彈性。將玻尿酸注入肌膚下，可以立即補充肌膚所需的天然成份，修復歲月帶來的損傷，通常用於撫平皺紋與填補臉部凹陷的部位，以及輪廓的修飾。Juvéderm® 喬雅登® 經歐盟 CE 認證，更獲美國食品及藥物管理局 FDA 核准效果可長達一年，是目前核准產品中效果最持久的玻尿酸注射凝膠。

注射前，醫師會依個別情況麻醉特定的治療部位，可能會使用冰敷、局部麻醉藥膏或注射局部麻醉劑，以降低療程進行所產生的不適感。

注射時，醫師會用極細的針頭注射，以「多次少量」的方式進行，美麗柔順的效果立即可見。

注射後可以利用冰敷，以舒緩療程造成的不適、減少瘀青產生或腫脹。在12小時內，建議您不要化妝；在24小時內，請避免劇烈運動及酒精攝取；在2週以內，請避免長期暴露在日光或紫外光下，或長期身處於過熱或過冷的環境中。

在接受Juvéderm® 喬雅登® 注射後，大部分的副作用在三天內會消失，大部分患者在療程後均可立即進行正常活動；有極少數人在注射區域會有泛紅、疼痛、腫脹、瘀血等情況，可能會持續一週。

如果您曾接受過永久的皮膚填充物(如：矽膠、鼻骨等)植入手術，在接受Juvéderm® 喬雅登® 注射之前應事先告知您的醫師。若您在接受治療時有用任何會延長出血之藥品，如阿斯匹靈等，會增加您出血及瘀青的機會，請於治療前告知您的醫師。

Juvéderm® 喬雅登® 不建議使用在懷孕及哺乳期婦女、18歲以下、容易產生蟹足腫或疤痕肥大體質的人士，亦不能使用在有嚴重過敏症病史者。

經過一段時間，Juvéderm® 喬雅登® 會逐漸被人體代謝而減少；Juvéderm® 喬雅登® 注射凝膠的效果通常可以持續6個月或以上，必須適時補充注射以維持Juvéderm® 喬雅登® 的最佳效果。

注射Juvéderm® 喬雅登® 之前，請與您的醫師詳細溝通您的需求，以達最好治療效果。

請預約您的回診日期，讓醫師檢視您的治療效果。



來自世界第一的肉毒桿菌素 BOTOX® 保妥適® 的製造廠美國愛力根公司
美國 FDA 核准效果最持久之玻尿酸注射凝膠

您的下次預約

時間 _____ 年 _____ 月 _____ 日

診所章加蓋 ▶

診所章